CATÁLOGO DE

PRODUTOS

LINHA PET

Biovet vaxxinova

Tradição movida pela inovação.

Sobre o Biovet Vaxxinova

Com um robusto portfólio para saúde animal, nossa empresa é referência em inovação e qualidade há mais de 60 anos, apresentando uma trajetória pioneira no Brasil e na América Latina. A paixão pela ciência distingue a nossa marca, cujas operações tradicionalmente têm como foco as pessoas e os clientes.

Biovet Vaxxinova tem sede e plantas de produção em Vargem Grande Paulista (SP), e centro de pesquisas e planta de produção em Ibiúna (SP). O investimento em novos conhecimentos e no contínuo aprimoramento da infraestrutura faz parte do DNA da marca Biovet Vaxxinova.

Por conta disso, entre outros diferenciais, nossas plantas fabris dispõem do maior laboratório de produção de vacina antirrábica do Brasil, de moderno laboratório para produção de vacina contra aftosa e do único laboratório para produção de vacina contra coccidiose aviária da América Latina.

Isso assegura o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de mais de 100 produtos, submetidos a um rigoroso sistema de garantia de qualidade, possibilitando aos médicos veterinários terem à disposição um arsenal para agir na prevenção ou no tratamento de enfermidades que desafiam diferentes segmentos da criação animal, como pecuária, avicultura, suinocultura, aquacultura e animais de companhia.

Nossa empresa integra o Grupo Vaxxinova, sediado em Nijmegen, na Holanda, que tem operações em mais de 50 países, centros de pesquisa, unidades produtivas e de diagnóstico na Alemanha, Estados Unidos, Itália, Noruega, Japão, Jordânia, além do Brasil. A Vaxxinova faz parte da empresa familiar EW Group, sediada na Alemanha.

Essa é a nossa marca desde 1957. Tradição movida pela inovação.

GASTROBLOCK

Único palatável no mercado
Facilidade na administração.

Comprimidos sulcados
Homogeneidade na dose e possibilidade de divisão.

INDICAÇÃO

GastroBlock é indicado para inibir a produção de acidez pelo estômago, sendo indicado para o tratamento de gastrites, erosões e demais lesões gástricas em cães e gatos.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 strip com 10 comprimidos ou display contendo 5 strip com 10 comprimidos cada.
Palatáveis

MODO DE USAR

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Peso do animal	Comprimidos de GastroBlock
5 kg	1/2 comprimido
10 kg	1 comprimido
15 kg	1 e 1/2 comprimidos
20 kg	2 comprimidos
30 kg	3 comprimidos
40 kg	4 comprimidos

*Para cães acima de 40 kg, seguir a dose de 1 mg/kg.

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Omeprazol	10,0 mg
Excipiente q.s.p.	120,0 mg

GastroBlock
omeprazol

Tratamento gástrico para cães e gatos.
Saúde por dentro, qualidade de vida por fora.

SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO

AÇÃO RÁPIDA NO TRATAMENTO DA CAUSA

ÚNICO COM FORMULAÇÃO PALATÁVEL

INDICADO PARA CÃES E GATOS • DE TODOS OS PORTES

GastroBlock é indicado para inibir a produção de acidez no estômago, para o tratamento de gastrites, erosões e demais lesões gástricas em cães e gatos.

Biovet
vaxxinova

MELOXITABS 0,5 mg

INDICAÇÃO

MELOXITABS 0,5 mg é um anti-inflamatório não esteroide, em formulação palatável, com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2).

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou display contendo 15 blisters com 10 comprimidos cada.

MODO DE USAR

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dosagem para cães:

Dia	Peso do animal	Dose
1	Cada 5 kg	2 comprimidos
2	Cada 5 kg	1 comprimido

Dosagem para gatos:

Animal	Peso do animal	Dose
Gato	Cada 5 kg	1 comprimido

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Meloxicam	0,5 mg
Excipiente q.s.p.	200,0 mg

MELOXITABS 2,0 mg

INDICAÇÃO

MELOXITABS 2,0 mg é um anti-inflamatório não esteroide, em formulação palatável, com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2).

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou display contendo 6 blisters com 10 comprimidos cada.

MODO DE USAR

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dia	Peso do animal	Dose
1	Cada 20 kg	2 comprimidos
2	Cada 20 kg	1 comprimido

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Meloxicam	2,0 mg
Excipiente q.s.p.	800,0 mg

MELOXITABS 4,0 mg

INDICAÇÃO

MELOXITABS 4,0 mg é um anti-inflamatório não esteroide, em formulação palatável, com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2).

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blister com 5 comprimidos ou display contendo 6 blisters com 5 comprimidos cada.

MODO DE USAR

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dia	Peso do animal	Dose
1	Cada 40 kg	2 comprimidos
2	Cada 40 kg	1 comprimido

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Meloxicam	4,0 mg
Excipiente q.s.p.	1.600,0 mg

INDICAÇÕES

AÇÃO ANALGÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIEXSUDATIVA

Patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteoarticular, tais como:

- Espondiloses
- Espondiloartroses anquilosantes
- Displasias coxofemorais
- Osteítes
- Artrites
- Artrites reumatoides
- Osteoartrites
- Calcificação de discos intervertebrais
- Reparação de fraturas
- Pós-operatório de artroplastias
- Traumatismos

MODO DE USAR E DOSAGEM

DOSAGEM PARA CÃES		
APRESENTAÇÃO	**1º DIA DE TRATAMENTO**	**2º DIA DE TRATAMENTO**
0,5 mg	2 comprimidos para cada 5 kg de peso	1 comprimido para cada 5 kg de peso
2,0 mg	2 comprimidos para cada 20 kg de peso	1 comprimido para cada 20 kg de peso
4,0 mg	2 comprimidos para cada 40 kg de peso	1 comprimido para cada 40 kg de peso

DOSAGEM PARA GATOS	
APRESENTAÇÃO	**TRATAMENTO**
0,5 mg	1 comprimido para cada 5 kg de peso

APRESENTAÇÕES

- **0,5 mg** – cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou display contendo 15 blisters com 10 comprimidos cada.

- **2,0 mg** – cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou display contendo 6 blisters com 10 comprimidos cada.

- **4,0 mg** – cartucho contendo 1 blister com 5 comprimidos ou display contendo 6 blisters com 5 comprimidos cada.

#DOSE CERTA DE CUIDADO

VERMIFUGUE O SEU PET PELO MENOS 3 VEZES AO ANO!

Dose de verão: janeiro a abril

- Pet exposto a novos ambientes
- Viaja, fica em hotelzinho ou na casa de outras pessoas

Dose de inverno: maio a agosto

- Por causa do frio, o pet passa mais tempo dentro de casa
- Com isso, aumentam as chances de transmissão de parasitas para a família

Dose de primavera: setembro a dezembro

- As temperaturas aumentam
- Os passeios são retomados e o pet volta a ter contato com o ambiente externo

WWW.LINHAVERMIVET.COM.BR

VERMIVET FILHOTE

INDICAÇÃO

VERMIVET FILHOTE é um vermífugo palatável oral de amplo espectro, indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestoides e nematoides dos cães e gatos.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL, acompanhado de seringa dosadora.

MODO DE USAR

Administrar por via oral: 1 mL/kg de peso do cão ou gato aos 15 dias, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º meses de idade.

CADA ML CONTÉM

Pamoato de pirantel	14,5 mg
Praziquantel	5,0 mg
Febantel	15,0 mg
Excipiente q.s.p.	1,0 mL

VERMIVET IVER 330 mg

INDICAÇÃO

VERMIVET IVER é um vermífugo palatável, que pode ser fornecido diretamente ao animal e que contém princípios ativos com grande margem de segurança para os cães.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 2 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	Até 2,5 kg	1/2 comprimido
	Acima de 2,5 kg até 5 kg	1 comprimido
	Acima de 5 kg até 7,5 kg	1 e 1/2 comprimido
	Acima de 7,5 kg até 10 kg	2 comprimidos

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (25 mg de pirantel base)	72,50 mg
Praziquantel	25 mg
Febantel	75 mg
Ivermectina	0,03 mg
Excipiente q.s.p.	330 mg

VERMIVET IVER 660 mg

INDICAÇÃO

VERMIVET IVER é um vermífugo palatável, que pode ser fornecido diretamente ao animal e que contém princípios ativos com grande margem de segurança para os cães.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 2 ou 4 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	Até 5 kg	1/2 comprimido
	Acima de 5 kg até 10 kg	1 comprimido
	Acima de 10 kg até 15 kg	1 e 1/2 comprimido
	Acima de 15 kg até 20 kg	2 comprimidos

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (50 mg de pirantel base)	145 mg
Praziquantel	50 mg
Febantel	150 mg
Ivermectina	0,06 mg
Excipiente q.s.p.	660 mg

VERMIVET PLUS 660 mg

INDICAÇÃO

VERMIVET PLUS 660 mg é um vermífugo oral de amplo espectro indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestoides e nematoides dos cães.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 4 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	Até 5 kg	1/2 comprimido
	Acima de 5 kg até 10 kg	1 comprimido
	Acima de 10 kg até 15 kg	1 e 1/2 comprimido
	Acima de 15 kg até 20 kg	2 comprimidos

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (50 mg de pirantel base – 34,6%)	145 mg
Praziquantel	50 mg
Febantel	150 mg
Excipiente q.s.p.	660 mg

VERMIVET PLUS 2,0 g

INDICAÇÃO

VERMIVET PLUS 2,0 g é um vermífugo oral de amplo espectro, indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestoides e nematoides dos cães.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 2 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	Acima de 10 kg até 15 kg	1/2 comprimido
	Acima de 15 kg até 30 kg	1 comprimido
	Acima de 30 kg até 45 kg	1 e 1/2 comprimido
	Acima de 45 kg até 60 kg	2 comprimidos

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (150 mg de pirantel base – 34,6%)	435 mg
Praziquantel	150 mg
Febantel	450 mg
Excipiente q.s.p.	2,0 g

VERMIVET GATOS

INDICAÇÃO

VERMIVET GATOS é um vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das principais verminoses que acometem os gatos.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 2 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Gato	Acima de 1 kg até 1,5 kg	1/2 comprimido
	Acima de 1,5 kg até 3 kg	1 comprimido
	Acima de 3 kg até 4,5 kg	1 e 1/2 comprimido
	Acima de 4,5 kg até 6 kg	2 comprimidos

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (60 mg de pirantel base)	174 mg
Praziquantel	15 mg
Excipiente q.s.p.	300 mg

VERMIVET COMPOSTO

INDICAÇÃO

VERMIVET COMPOSTO é um vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das principais verminoses que acometem os cães e gatos.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 4 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Espécie	Peso do animal	Dose
Gato	Acima de 1 kg até 3 kg	1/2 comprimido
	Acima de 3 kg até 6 kg	1 comprimido
Cão	Até 5 kg	1/2 comprimido
	Acima de 5 kg até 10 kg	1 comprimido
	Acima de 10 kg até 15 kg	1 e 1/2 comprimido

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Pamoato de pirantel (120 mg de pirantel base)	348 mg
Praziquantel	30 mg
Excipiente q.s.p.	600 mg

— NOVO —

portal VERMIVET

— NO AR —



REPAGINAMOS O SITE PARA OFERECER AINDA MAIS INFORMAÇÃO.

O portal Vermivet está de cara nova, sempre lembrando da necessidade das 3 doses anuais de acordo com a estação – verão, inverno e primavera. Lá o consumidor encontra conteúdo que vai ajudá-lo a prevenir as verminoses em seus animais de estimação, além de um novo blog com dicas e cuidados para os pets e uma ferramenta que avisa por SMS sobre a hora certa de administrar Vermivet.

VISITE E DIVULGUE:
linhavermivet.com.br

verão 3 doses por ano inverno primavera

BIOFLOXACIN 50 mg

INDICAÇÃO

BIOFLOXACIN é um antimicrobiano com amplo espectro de ação, indicado no tratamento de diversas doenças infecciosas de cães e gatos, causadas por bactérias gram positivas, gram negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis à enrofloxacina.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 10 comprimidos cada.

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido para 10 kg de peso, 1 ou 2 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos. Em casos de infecções crônicas ou persistentes, sempre a critério do médico veterinário, o tratamento poderá se estender por 10 dias consecutivos.

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Enrofloxacina	50 mg
Excipiente q.s.p.	115 mg

BIOFLOXACIN 150 mg

INDICAÇÃO

BIOFLOXACIN é um antimicrobiano com amplo espectro de ação, indicado no tratamento de diversas doenças infecciosas de cães e gatos, causadas por bactérias gram positivas, gram negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis à enrofloxacina.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 10 comprimidos cada.

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido para 30 kg de peso, 1 ou 2 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos. Em casos de infecções crônicas ou persistentes, sempre a critério do médico veterinário, o tratamento poderá se estender por 10 dias consecutivos.

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Enrofloxacina	150 mg
Excipiente q.s.p.	345 mg

DIPIRONA GOTAS

INDICAÇÃO

Dipirona é indicado para cães e gatos, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL e bula.

MODO DE USAR

Administrar, por via oral, 1 gota por kg de peso corpóreo, até o máximo de 35 gotas. Repetir, se necessário, após 4 a 6 horas.



PLASIVET

INDICAÇÃO

PLASIVET é um antiemético oral à base de metoclopramida para cães e gatos.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL e bula.

MODO DE USAR

Administrar, por via oral, 1 gota por kg de peso corpóreo, que corresponde à dosagem indicada de 1 mg de metoclopramida por kg de peso corpóreo.

1 gota/kg
25 gotas = 1 mL

CADA 100 ML CONTÉM

Metoclopramida (cloridrato monohidratado)	2,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

ECZEVET

INDICAÇÃO

ECZEVET é indicado nas condições em que os efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores são desejados.

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 12 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

Tratamento inicial:

Gatos: 1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães até 10 kg: 1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães acima de 10 kg: 2 comprimidos ao dia durante 5 dias consecutivos.

Tratamento de manutenção:

Gatos: 1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães até 10 kg: 1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães acima de 10 kg: 1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Dexametasona	1 mg
Nicotinamida	10 mg
Piridoxina	50 mg
Metionina	300 mg
Excipiente q.s.p.	660 mg

STIMO-TON

INDICAÇÃO

Suplemento vitamínico e aminoácido para cães e gatos em fase de crescimento e auxiliar nos processos de nutrição, estímulo do apetite e aporte energético.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 125 mL

MODO DE USAR

Administrar, por via oral, 0,5 mL/kg de peso vivo.

COMPRIMIDOS PALATÁVEIS

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO

Ácido aspártico (mín.)	3.180,00 mg/kg
Ácido glutâmico (mín.)	5.268,00 mg/kg
Alanina (mín.)	4.898,00 mg/kg
Arginina (mín.)	3.427,00 mg/kg
Betaína (mín.)	10,00 g/kg
Cisteína (mín.)	216,00 mg/kg
Colina (mín.)	10,00 g/kg
DL-metionina (mín.)	10,00 g/kg
Fenilalanina (mín.)	1.560,00 mg/kg
Glicina (mín.)	13,612 g/kg
Glicose (mín.)	200,00 g/kg
Hidroxiprolina (mín.)	4.465,00 mg/kg
Histidina (mín.)	652,00 mg/kg
Isoleucina (mín.)	818,00 mg/kg
L-carnitina (mín.)	10,00 g/kg
L-lisina (mín.)	10,00 g/kg

Leucina (mín.)	1.905,00 mg/kg
Lisina (mín.)	2.397,00 mg/kg
Metionina (mín.)	10,71 g/kg
Pantotenato de cálcio (mín.)	1.000,00 mg/kg
Prolina (mín.)	7.455,00 mg/kg
Serina (mín.)	927,00 mg/kg
Tirosina (mín.)	703,00 mg/kg
Treonina (mín.)	543,00 mg/kg
Triptofano (mín.)	156,00 mg/kg
Valina (mín.)	1.413,00 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	1.500,00 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	2.000,00 mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	1.000,00 mg/kg

PROBIÓTICO BIOVET

INDICAÇÃO

Suplemento alimentar para cães e gatos, indicado como auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal.

APRESENTAÇÃO

Display com 6 seringas de 14 g cada.

MODO DE USAR

Deve ser aplicado diretamente na boca do animal.

Cães de pequeno porte e gatos: recém-nascidos (1 g) e adultos (2 g).

Cães de grande porte: recém-nascidos (2 g) e adultos (4 g).

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO

Bifidobacterium bifidum	3,33 x 10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium	1,66 x 10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus	3,33 x 10^8 UFC/kg
Lactobacillus plantarum	1,66 x 10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae	3,33 x 10^8 UFC/kg
Vitamina C (mín.)	10,00 g/kg

PREVE-GEST 5 MG

INDICAÇÃO

Produto de formulação terapêutica à base de acetato de megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration). Molécula antiestrogênica, antiovulatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.

Pseudociese – 0,5 mg por kg de peso corpóreo, 1 vez ao dia, durante 8 dias seguidos (1 comprimido para cada 10 kg).

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 12 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

TABELA DE DOSAGEM

CADELAS	BLOQUEAR O CIO		RETARDAR O CIO
	Durante os 3 primeiros dias	*6 dias seguintes de cio*	*Durante 30 dias, máximo de 60 dias*
Até 3 kg	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*	*1/4 compr./dia*
De 3 kg até 6 kg	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*
De 6 kg até 10 kg	*3 compr./dia*	*1 e 1/2 compr./ dia*	*1 compr./dia*
GATAS	*1 compr./dia por 8 dias (iniciar no primeiro dia do cio)*		*1/2 compr. a cada 2 dias (máximo de 10 semanas)*

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Acetato de megestrol	5 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg

PREVE-GEST 20 MG

INDICAÇÃO

Produto de formulação terapêutica à base de acetato de megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration). Molécula antiestrogênica, antiovulatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.

Pseudociese – 0,5 mg por kg de peso corpóreo, 1 vez ao dia, durante 8 dias seguidos (1 comprimido para cada 10 kg).

APRESENTAÇÃO

Display com 10 caixas com 12 comprimidos cada e bula.

MODO DE USAR

TABELA DE DOSAGEM – CADELAS

PESO	BLOQUEAR O CIO		RETARDAR O CIO
	Durante os 3 primeiros dias	*6 dias seguintes de cio*	*Durante 30 dias, máximo de 60 dias*
De 10 kg até 19 kg	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*
De 19 kg até 29 kg	*2 e 1/2 compr./dia*	*1 e 1/4 compr./dia*	*3/4 compr./dia*
De 29 kg até 39 kg	*3 compr./dia*	*1 e 1/2 compr./dia*	*1 compr./dia*
Acima de 39 kg	*4 compr./dia*	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*

CADA COMPRIMIDO CONTÉM

Acetato de megestrol	20 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg

IMUNO-VET R

INDICAÇÃO

Imuno-Vet R é uma vacina inativada contra a raiva, para cães e gatos.

APRESENTAÇÃO

Blister contendo 20 doses de 1 ml cada.

MODO DE USAR

A vacinação é realizada injetando-se o produto por via intramuscular ou subcutânea;
Agitar antes do seu uso;
A dose é 1 de mL para cães;
A idade ideal para a vacinação é acima de 3 meses ou a critério do médico veterinário;
Revacinar anualmente.

IMUNO-VET

INDICAÇÃO

Imuno-Vet é uma vacina polivalente que protege contra a cinomose, hepatite infecciosa canina, adenovírus tipo 2, parainfluenza, parvovirose, coronavirose e leptospirose canina.

APRESENTAÇÃO

Blister contendo 10 doses de 1 mL cada.

MODO DE USAR

Recomenda-se a aplicação de 3 doses (devido à interferência de anticorpos maternos), sendo a primeira dose a partir de 45 dias e as demais doses com intervalo de 21 dias cada ou a critério do médico veterinário;

Revacinar com 1 (uma) dose anual;

Administrar por via subcutânea o conteúdo da vacina liofilizada reconstituído com o diluente.

BOUBA DAS AVES (FORTE)

INDICAÇÃO

Bouba das Aves (Forte) é indicada para galinhas reprodutoras, galinhas poedeiras comerciais e frangos de corte no controle da bouba aviária.

APRESENTAÇÃO

Blister com 5 frascos-ampola de liofilizado (100 doses cada) e 5 frascos de diluente especial.

MODO DE USAR

A aplicação da vacina Bouba das Aves (Forte) pode ser feita das seguintes maneiras:

Punção na asa: Após a reconstituição da vacina com o diluente, mergulhar o aplicador no frasco e perfurar a “membrana da asa” pela parte de baixo, evitando as penas, vasos sanguíneos, nervos e ossos. Repetir o procedimento para cada ave.

Escarificação da coxa: Retirar algumas penas da região interna da coxa. Mergulhar o bulbo de uma pena na vacina reconstituída e aplicar sobre os folículos das penas retiradas.Após 7 dias, observar o local de aplicação e verificar a “pega” da vacina, os nódulos, que dentro de poucos dias desaparecem. Se essa reação não ocorrer, deve-se repetir a vacinação. A vacinação é recomendável a partir de 21 dias de idade ou a critério do médico veterinário.

NEW VACIN (LA SOTA)

INDICAÇÃO

New-Vacin (La Sota) imuniza frangos de corte, galinhas poedeiras comerciais e matrizes leves e pesadas, na prevenção da doença de Newcastle, uma das moléstias infecciosas mais graves das aves.

APRESENTAÇÃO

Blister com 10 frascos de vacina liofilizada. Cada frasco contém 100 doses sem diluente.

MODO DE USAR

A aplicação da vacina viva contra a doença de Newcastle – New-Vacin (La Sota) – pode ser feita por instilação nasal ou ocular, com o auxílio de um conta-gotas ou por via oral, na água de bebida.

TABELAS DE DOSES - LINHA PET BIOVET VAXXINOVA

GASTROINTESTINAL

GastroBlock	1 mg/kg.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

Meloxitabs 0,5 mg	1º dia de tratamento: 2 comprimidos para 5 kg.	2º dia em diante: 1 comprimido para 5 kg.
Meloxitabs 2,0 mg	1º dia de tratamento: 2 comprimidos para 20 kg.	2º dia em diante: 1 comprimido para 20 kg.
Meloxitabs 4,0 mg	1º dia de tratamento: 2 comprimidos para 40 kg.	2º dia em diante: 1 comprimido para 40 kg.

VERMÍFUGOS

Vermivet Filhote	1 mL por kg.
Vermivet Iver 330 mg	1 comprimido para 5 kg.
Vermivet Iver 660 mg	1 comprimido para 10 kg.
Vermivet Plus 660 mg	1 comprimido para 10 kg.
Vermivet Plus 2,0 g	1 comprimido para 30 kg.
Vermivet Gatos	1 comprimido para 3 kg.
Vermivet Composto	1 comprimido para 10 kg.

ANTIMICROBIANOS

Biofloxacin 50 mg	1 comprimido para 10 kg.
Biofloxacin 150 mg	1 comprimido para 30 kg.

ANTIPIRÉTICO

Dipirona Gotas Biovet	1 gota por kg.

ANTIEMÉTICO

Plasivet	1 gota por kg.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Eczevet	***Tratamento inicial*** *· Gatos: 1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos* *· Cães: 1 comprimido para cada 10 kg de peso ao dia durante 5 dias consecutivos.* ***Tratamento de manutenção*** *· Gatos: 1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos* *· Cães: 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso ao dia, durante 5 dias consecutivos.*

SUPLEMENTOS

Stimo-Ton	0,5 mL por kg.
Probiótico Biovet	Cães de pequeno porte e gatos: recém-nascidos (1 g) e adultos (2 g). Cães de grande porte: recém-nascidos (2 g) e adultos (4 g).

VACINAS

Imuno-Vet R	1 mL para cães.
Imuno-Vet	1 mL cada.
Bouba das Aves (Forte)	Blister com 5 frascos-ampola de liofilizado (100 doses cada) e 5 frascos de diluente especial.
New-Vacin (La Sota)	Cães de pequeno porte e gatos: recém-nascidos (1 g) e adultos (2 g). Cães de grande porte: recém-nascidos (2 g) e adultos (4 g).

TERAPÊUTICOS HORMONAIS

Preve-Gest 5 mg

CADELAS	BLOQUEAR O CIO		RETARDAR O CIO
	Durante os 3 primeiros dias	*6 dias seguintes de cio*	*Durante 30 dias, máximo de 60 dias*
Até 3 kg	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*	*1/4 compr./dia*
De 3 kg até 6 kg	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*
De 6 kg até 10 kg	*3 compr./dia*	*1 e 1/2 compr./dia*	*1 compr./dia*
GATAS	*1 compr./dia por 8 dias (iniciar no primeiro dia do cio)*		*1/2 compr. a cada 2 dias (máximo de 10 semanas)*

Informação complementar:
Pseudociese – 0,5 mg por kg de peso corpóreo, 1 vez ao dia, durante 8 dias seguidos (1 comprimido para cada 10 kg).

Preve-Gest 20 mg

PESO	BLOQUEAR O CIO		RETARDAR O CIO
	Durante os 3 primeiros dias	*6 dias seguintes de cio*	*Durante 30 dias, máximo de 60 dias*
De 10 kg até 19 kg	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*	*1/2 compr./dia*
De 19 kg até 29 kg	*2 e 1/2 compr./ dia*	*1 e 1/4 compr./ dia*	*3/4 compr./dia*
De 29 kg até 39 kg	*3 compr./dia*	*1 e 1/2 compr./ dia*	*1 compr./dia*
Acima de 39 kg	*4 compr./dia*	*2 compr./dia*	*1 compr./dia*

Informação complementar:
Pseudociese – 0,5 mg por kg de peso corpóreo, 1 vez ao dia, durante 8 dias seguidos (1 comprimido para cada 10 kg).